

Fungicydy do ochrony plantacji buraka cukrowego przed chorobami liści

Fungicydy	Substancje aktywne	Zwalczane choroby	Dawka na 1ha	Uwagi
Amistar Gold Max	azoksystrobina (strobiluryny) 125 g/l, difenokonazol (triazole) 125 g/l	chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści	1,0 l	Okres karencji 35 dni.
Bagani 125 ME	tettrakonazol (triazole) 125 g/l	chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka	0,8 l	Okres karencji 30 dni.
Dafne 250 EC	difenokonazol (triazole) 250 g/l	chwościk buraka	0,4 l	Okres karencji 62 dni !!!
Eminent 125 ME	tettrakonazol (triazole) 125 g/l	chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka	0,8 l	Okres karencji 30 dni.
Galileo	tettrakonazol (triazole) 125 g/l	chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka	0,8 l	Okres karencji 30 dni.
Kier 450 SC	azoksystrobina (strobiluryny) 200 g/l, difenokonazol 125 g/l, tebukonazol (triazole) 125 g/l	chwościk buraka, brunatna plamistość liści	0,8÷1,0 l	Okres karencji 35 dni.
Makler 250 SE	azoksystrobina (strobiluryny) 250 g/l	chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści	1,0 l	Okres karencji 35 dni.
Porter 250 EC	difenokonazol (triazole) 250 g/l	chwościk buraka	0,4 l	Okres karencji 62 dni !!!
Spyrale 475 EC	fenpropidyna (morfoliny) 375 g/l, difenokonazol (triazole) 100 g/l	chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rdza buraka	1,0 l	Okres karencji 28 dni.
Tebu 250 EW	tebukonazol (triazole) 250 g/l	chwościk buraka, mączniak prawdziwy	0,8 l	Okres karencji 30 dni.
Yukon	miedź (w postaci trójzasadowego siarczanu miedzi) - 80 g/l, siarka - 640 g/l	chwościk buraka	5,5 l	Okres karencji 14 dni.